

Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849)

Colotis dairia (Klug, 1829)

Colias del desierto



Pertenece a un género fundamentalmente africano, que presenta oleadas migratorias, sus primeras citas españolas datan de 1950 y se conocen colonias en Murcia, si bien se ha discutido que pueda completar su ciclo biológico aquí. Tamaño pequeño: 30-36mm.

Presenta generaciones desde marzo hasta septiembre-octubre.

El abdomen de las generaciones primaverales es negro y blanquecino en las estivales.

Es una mariposa muy sensible a la humedad, presentando formas secas y formas húmedas, las formas secas se caracterizan por la reducción de dibujos negros y por el color amarillento del reverso de sus alas posteriores, mientras que las formas húmedas desarrollan amplios dibujos negros en sus alas y el reverso de sus alas posteriores adopta un color rosado con puntitos pardos.

Planta nutricia: Tapenera Caparidáceas (*Capparis spinosa*)

Habitat: Lugares calidos, rocosos, barrancos, márgenes de campos de cultivo.

En África es una mariposa montana, mientras que en España vive ligada a la costa, vive entre 0 y 1000 m

Especie parecida es *Anthocharis euphenoides*, que presenta una rejilla verdosa en la cara posterior del ala inferior.

