

La tórtola europea(*Streptopelia turtur*) y la urgente necesidad de tomar medidas para evitar su excesiva caza



La tórtola o tortora, denominada en valenciano, es un ave que tiene su llegada a partir de mediados de abril y principios de mayo, aunque hay excepciones y se han llegado a ver en La Sierra de Salinas en los últimos días de marzo. Su vuelo es rápido con giros y piruetas que nos sorprenden, plumaje con partes superiores pardo tirando a rojizo y cuando se eleva para realizar el vuelo se le observa con toda claridad la parte más externa de las cola de color blanquecino.

Los primeros días de su llegada se les puede sorprender alimentándose en los caminos o veredas, también buscando pequeñas piedrecitas. Las manchas en el cuello también la



Ave que está a punto de beber en una fuente de montaña, al igual que ella bajan: paloma torcaz, pito real, perdiz y un largo etc. Sitios que son esperados por los cazadores para abatirlas en gran número.

diferencian. Su continuo ronroneo tuur....tur... le delatan. Se toman su tiempo a la hora de bajar tanto a alimentarse como a saciar sus sed. Muchas veces se les ve cerca de las charcas que los cazadores preparan en los cotos.

Zonas linderas entre pinada y cultivos de secano son los lugares adecuados para que estas aves se instalen. Prefieren los pinos para construir sus nidos de poco porte, escasas ramitas entrecruzadas formaran su aposento para incubar de 3 a 5 huevos. Aunque nosotros en el

termino municipal de Villajoyosa hemos detectado nidos en coscojas a escasos 90 cm del suelo, los pollitos sin plumas esperan en silencio a los adultos.

Su alimentación suele ser variada, desde pequeñas bayas a semillas de leguminosas y otras hierbas. No desprecian en época de cría algún pequeño insecto. Y si existe alguna plantación de girasoles la visitan varias veces al día.

Históricamente el profesor Guirao la catalogaba en el siglo XIX como sedentaria en Murcia. Dato que Abilio Reig me ratifica y lo aplica también para la paloma torcaz. No es que dude de la cita, pero no tenía documentación a mano para constatarla.

Según observaciones de varios autores (Roque Martínez, Toni Ortuño, José Villalba, José López y José Carpena) cuando se concede el permiso de media veda en agosto existen nidos activos de tórtola y algunas caen abatidas por los disparos. Esto hace **que vaya decayendo de forma alarmante la población de esta ave.**

Nosotros no tenemos todavía resultados fehacientes. Pero pronto se podrá disponer de datos y nos demostrarán esta fundada sospecha que ahora tenemos de forma subjetiva. No es tan sólo en la región levantina el problema es a nivel peninsular. Todo esto hace que tendremos que aunar criterios y solicitar de forma razonada y con datos una moratoria de caza para la tórtola europea.

También la paloma Tendremos que torcaz cae abatida y algunas se encuentran en la segunda puesta, aunque esta se ha adaptado y su población parece en auge, claro esto de apreciación.

Su estancia en nuestras tierras se limita a los meses que van de abril hasta mediados de septiembre las más relajadas. Siendo ya raro ver tórtolas a finales de septiembre.

No podemos terminar este pequeño escrito sin mencionar el espectacular aumentos de tórtola turca, que con su tendencia a ocupar pequeñas pinadas de urbanizaciones se está salvando de los tiros y aumentando el número de efectivos. Pero esta a diferencia de la tórtola europea no busca las pinadas a las afueras de los pueblos, sino que se sitúa cerca de la presencia humana. Y su comportamiento digno de ser observado le hace llegar a tener 3 crías al año.

Fuentes utilizadas:

1º Cuadernos de campo de T. Zaragozaí

2º Cuadernos de Campo de E. Gomis.

3º Atlas de las aves de Jumilla y Yecla (R. Martínez, T. Ortuño....etc).

4º Consulta telefónica a Abilio REIG.